

Barra Mansa-RJ, 14 de Fevereiro de 2024.

**PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRA MANSA
EDITAL Nº 001/2024-SCBM**

LISTA DE EXCEDENTES APÓS DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO

PROGRAMA: CLÍNICA MÉDICA

9º Classificado: GUSTAVO POMPEI MATTA

Nº de Inscrição: 47

Pontuação: 59

Critério de Desempate 1 : 12



Questão 9 – Indeferida

Assim como as concentrações séricas matinais de cortisol, a excreção basal de cortisol urinário é baixa em pacientes com insuficiência adrenal grave, mas pode ser baixa ou normal em pacientes com insuficiência adrenal parcial. Portanto, eles não podem ser usados como teste de triagem para insuficiência adrenal. A excreção urinária de cortisol é baixa em pacientes com insuficiência adrenal primária e secundária e naqueles com hiperplasia adrenal congênita (HAC). No entanto, os valores nesses pacientes se sobrepõem à parte inferior do intervalo de referência normal. Portanto, o exame sozinho não é confiável para o diagnóstico dessas condições.

Além disso, os ensaios de cortisol urinário não são um bom indicador da adequação da reposição de cortisol ou cortisona.

1. [Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101:364.](#)
2. [Burch WM. Urine free-cortisol determination. A useful tool in the management of chronic hypoadrenal states. JAMA 1982; 247:2002.](#)

Questão 15 – Deferida

Questão anulada por ausência de resposta correta.

Questão 30 – Indeferida

“ O esôfago de Barret é uma condição em que um epitélio colunar intestinal substitui o epitélio escamoso estratificado que normalmente reveste o esôfago distal “,
“ A presença de um segmento de mucosa colunar encontrado durante o exame endoscópico, e identificado como metaplasia intestinal no exame histopatológico define o esôfago de Barret “.

Portanto, existe opção correta nas alternativas, o esôfago de Barret se caracteriza como uma metaplasia intestinal, resposta certa: letra D.

Tratado de Cirurgia - Sabiston - 19ª edição - páginas 1033 e 1034 - capítulo 43 - Esôfago

Questão 32 – Indeferida

O equívoco na formatação da prova não inviabiliza o enunciado bem como suas respostas.

Questão 65 – Deferida

Mudança de gabarito de C para D

Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa

Rua Pinto Ribeiro, 205 - Centro, Barra Mansa/RJ
CEP: 27.310-420

☎ 24 3325.8300
f @ santacasabm
🌐 www.scbm.org.br



"A tradição de cuidar, vivendo novos tempos".

Barra Mansa-RJ, 03 de fevereiro de 2023.

Questão 77- Indeferida

BI-RADS 4: Suspeito – Esta categoria implica que existe uma lesão com características suspeitas de malignidade. A chance de que o achado de imagem seja um câncer varia entre 2 e 94 por cento. O grau de suspeita ou preocupação com malignidade varia tanto com a lesão quanto com o intérprete.

A categoria BI-RADS 4 é muito ampla e os achados são compatíveis com carcinoma ductal in situ (CDIS) e câncer de mama invasivo. As subdivisões desta categoria foram introduzidas para transmitir o nível de preocupação, para que o paciente e seu médico possam tomar uma decisão informada sobre o tratamento. Essas subcategorias são:

- BI-RADS 4A – Chance de malignidade de 2 a 9 por cento
- BI-RADS 4B – chance de malignidade de 10 a 49 por cento
- BI-RADS 4C – Chance de malignidade de 50 a 94 por cento

Somente a resposta C se enquadra nessa classificação.

3. American College of Radiology. American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System BI-RADS, 5th ed, D'Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA, et al. (Eds), American College of Radiology, Reston, VA 2013.

Questão 84 – Deferida

Considerada as respostas B e C

Questão 87 – Deferida

Questão anulada.

Questão 92 – Deferida

Questão anulada.

Questão 94 – Deferida

Mudança de gabarito de A para B

**Santa Casa de Misericórdia
de Barra Mansa**

Rua Pinto Ribeiro, 205 - Centro, Barra Mansa/RJ
CEP: 27.310-420

☎ 24 3325.8300
f @ santacasabm
🌐 www.scbm.org.br

